

## دانشجویان محترم گروه پزشکی

با توجه به شیوع آنفلوآنزا فصلی توجه عزیزان را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

- در موقع مواجهه با بیماران مشکوک به آنفلوآنزا(تب بالای ۳۸ درجه، سرفه، درد عضلانی) از وسایل حفاظت فردی (ماسک، دستکش و....) استفاده نمایید.
  - دستها را مکرراً با آب و صابون بشویید.
  - بهترین درمان برای بیماران مبتلا استراحت در منزل، استفاده از مایعات گرم و همچنین ضد درد و تب بر در صورت نیاز می‌باشد.
  - در صورت مشاهده موارد مشکوک به آنفلوآنزا که دارای خلط خونی، دیسترس تنفسی و عالیم مغزی می‌باشند را به مافوق خود گزارش نمایید.
  - به بیماران مشکوک به آنفلوآنزا توصیه شود در صورت عدم بھبودی در عرض سه روز، مجدداً مراجعه نمایند تا از نظر ARDS پنومونی باکتریال، میوکاردیت و آنسفالیت برسی گرددند.
  - نیازی به تجویز آنتی بیوتیک در این بیماری وجود ندارد اما اگر بیمار سابقه سینوزیت، برونشیت و یا اوتیت داشته باشد سه روز درمان پروفیلاکسی تجویز می‌گردد و اگر علایمی از این بیماریها داشته باشد به مدت یک هفته آنتی بیوتیک مناسب تجویز می‌گردد.
  - داروی ضد ویروسی اولستاتامیویر به شکل کپسول بوده و در موارد خاص و براساس دستورالعمل کشوری برای درمان (به مدت ۵ روز) و برای پروفیلاکسی (به مدت ۷ تا ۱۰ روز) بر اساس گروه سنی و وزن تجویز می‌گردد
  - واکسن آنفلوآنزا جهت گروههای در معرض خطر (دیابت، بیماریهای مزمن تنفسی، نارسایی قلبی، زنان باردار و ...) و گروههای در معرض تماس (کارکنان بهداشتی و درمانی) توصیه و تجویز می‌گردد.
  - گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان با شماره تلفن ۰۴۱۳۲۳۳۰۳۰۹ پاسخگوی شما می‌باشد.
- افتراق آنفلوآنزا از سرماخوردگی**

علائم بالینی	آنفلوآنزا	سرماخوردگی
علام پیش درآمد	ندارد	یک روز یا بیشتر
شروع	ناگهانی	تدریجی
تب	۳۸/۳ تا ۳۹ درجه سانتی گراد	در بالغین نادر
سردرد	ممکن است شدید باشد	نادر
دود عضلانی	معمولًا وجود دارد و اغلب شدید	متوسط
خستگی مفروط	معمولًا وجود دارد	هرگز
خستگی/ضعف	ممکن است بیشتر از دو هفته باشد	متوسط
ناراحتی گلو	شایع	گاهی / اغلب
عطسه	گاه گاهی	معمولًا وجود دارد
التهاب بینی	گاه گاهی	معمولًا وجود دارد
سرفه	معمولًا دارد و خشک	متوسط و منقطع /مزاحم